


Resultado (cobertura)

Resultado (uso/comportamento do serviço)

Impacto

Preservativos		Uso de preservativo com parceiros não regulares (%)		Novas infecções por VIH (tendência para maiores de 15 anos versus metas de 2020 e 2025)	
Número de preservativos distribuídos e vendidos/ano (em milhões)	23	Mulheres 15-49	27	2010	21 000
Número de preservativos distribuídos/vendidos por casal-ano (faixa etária 15-64)	3	Homens 15-49	46	2015	14 000
Estimativa de distribuição de preservativos necessária alcançada (%)	12			2020	5 100
				2025	4 100
Homens e meninos (incluindo VMMC)		% alcançada da meta de VMMC para 2020		Prevalência de VIH	
Número de VMMCs realizados/ano (em milhares)	na	Homens	na	PS <25 anos	id
% da meta anual de CMMV alcançada	na	Homens 15-24	96	PS todas as idades	id
		Homens 15-49	96		
Prevenção baseada em ARV		% da necessidade nacional de PrEP atendida		Prevalência de VIH	
Pontuação composta de PrEP (0-10)	1	Todos pop.	0		
Número de pessoas que receberam PrEP pelo menos uma vez nos últimos 12 meses	0	Mulheres 15+	id		
% de PVVIH em TARV	50	Homens 15+	id		
Populações-chave					
Trabalhadoras/es sexuais (TS)		Uso de preservativo/última relação sexual paga (%)		PS <25 anos	
Estimativa do tamanho da população para profissionais do sexo	id	PS	id	PS <25 anos	id
% de TS que receberam pelo menos duas intervenções de prevenção do VIH (últimos 3 meses)	51	Homens 15-49	71	PS todas as idades	id
Estratégia de prevenção, incluindo principais elementos do pacote de prevenção de TS	> Metade	% em ART	id		
Homens gays e outros homens que praticam sexo com homens (HSH)		Uso de preservativo/último sexo anal (%)		HSH <25 anos	
Estimativa do tamanho da população para homens que fazem sexo com homens	id	HSH	id	HSH <25 anos	id
% de HSH que receberam pelo menos duas intervenções de prevenção do VIH (últ. 3 meses)	3	% em ART	id	HSH todas as idades	id
Estratégia de prevenção, incluindo principais elementos do pacote de prevenção de HSH	> Metade				
Pessoas que injetam drogas (PID)		% com práticas seguras de injeção		PID <25 anos	
Estimativa do tamanho da população para pessoas que injetam drogas	id	PID	id	PID <25 anos	id
% de PID que recebeu pelo menos duas intervenções de prevenção do VIH (últimos 3 meses)	id	% no tratamento de substituição de opioides	id	PID todas as idades	id
Estratégia de prev., incluindo os elementos centrais do pacote de redução de riscos (PID)	Nenhum	% em ART	id		
Barreiras estruturais e facilitadores		% de pessoas que evitaram tratamento de saúde devido a estigma e a discriminação			
Criminalização do trabalho sexual	Não	PS	id		
Criminalização de atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo	Não	HSH	id		
Criminalização do uso/consumo ou posse de drogas para uso pessoal	id	PID	id		
Criminalização de transgêneros	#N/A	Transgênero	id		
Adolescentes, mulheres jovens (MAMJ) e parceiros em ambientes de alta incid. de VIH		Uso de preservativo com parceiros não regulares (%)		Mulheres 15-24	
% de locais/distritos prioritários com programas dedicados para MAMJ e parceiros	id	Mulheres 15-24	31	Mulheres 15-24	0.7
Políticas educacionais sobre VIH e educação sexual (ensino secundário)	Sim	Rapazes 15-24	46	Rapazes 15-24	0.3
Leis que exigem consentimento parental para o acesso a serviços de testes de VIH	Sim, <16	% que concl. o terceiro ciclo do ensino básico	32	Adultos, 15+	1.4
Promoção do preservativo iniciada pelo fornecedor integrada nos serviços de SSR	Sim	% de mulheres sofreram violência física ou sexual do marido/companheiro	id		
Serviços de testagem de VIH integrados aos serviços de SSR	Sim		id		



Linha de base 2010

● 2020, 2022

◆ Meta 2020

◆ Meta 2025

As metas para 2020 e 2025 representam a contribuição necessária do país para as metas globais, uma redução de 75% até 2020 e uma redução de 82,5% até 2025 em relação a 2010 como linha de base.

Resumo das pontuações

MAMJ	3
PS	6
HSH	id
PID	id
Preservativos	2
CMMV	na
ART	5
PrEP	1

Siglas: na ... não aplicável;  
 PVVIH...pessoas vivendo com VIH; VIH...vivendo com VIH; YW...mulheres jovens; YM...homens jovens;  
 SSR ... saúde sexual e reprodutiva.

<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Muito bom	<span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Baixo
<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Bom	<span style="background-color: #FFA500; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Muito baixo
<span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Médio	<span style="background-color: #FFB6C1; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Dados insuficientes