

Seleccione el país del menú desplegable

Colombia

COL

Basado en los datos disponibles más recientes.

Versión 2.02.

2023


Producto (cobertura)

Resultado (uso del servicio/comportamiento)

Impacto

<b>Prevención basada en ARV</b>	
Puntuación compuesta de PrEP (0-10)	0
Número de personas que recibieron PrEP al menos una vez en los últimos 12 meses	1636
% de PLHIV en ART	id

<b>Grupos de población clave</b>	
<i>Trabajadores/as sexuales (TS)</i>	
Estimación del tamaño de la población de trabajadores y trabajadoras sexuales	id
% de TS que recibieron al menos dos intervenciones de prevención del VIH (últimos 3 meses)	90
La estrategia de prevención incluye elementos básicos del paquete de prevención de TS	< Mitad
<i>Hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)</i>	
Estimación del tamaño de la población de HSH	505000
% de HSH que recibieron al menos dos intervenciones de prevención del VIH (últimos 3 meses)	14
La estrategia de prevención incluye elementos básicos del paquete de prevención de HSH	< Mitad
<i>Personas que se inyectan drogas (PID)</i>	
Estimación del tamaño de la población de personas que se inyectan drogas	7600
% de PID que recibieron al menos dos intervenciones de prevención del VIH (últimos 3 meses)	42
La estrategia de prev. incluye elementos básicos del paquete de reducción de daños (PID)	< Mitad
<i>Facilitadores y barreras estructurales</i>	
Penalización del trabajo sexual	No
Penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo	No
Penalización del uso/consumo o posesión de drogas para uso personal	#N/A
Penalización de las personas transgénero	No



Referencia 2010  
● 2020, 2022  
◆ Meta 2020  
◆ Meta 2025

Las metas de 2020 y 2025 representan la contribución requerida del país a las metas mundiales, una reducción del 75% para 2020 y del 82,5% para 2025 con respecto a 2010 como referencia.

<b>Prevalencia del VIH</b>	
Uso del preservativo/última relación sexual remunerada (%)	TS
Hombres 15-49	85
% en ART	TS LHIV
	86
Uso del preservativo/último sexo anal (%)	HSH
HSH LHIV	90
% en ART	HSH LHIV
	90
% con prácticas seguras de inyección	PID
% en terapia de sustitución de opiáceos	PID LHIV
	68

TS <25 años	id
TS todas las edades	id
HSH <25 años	id
HSH todas las edades	id
PID <25 años	id
PID todas las edades	id

**Puntuaciones resumidas**

TS	9
HSH	id
PID	3
ART	id
PrEP	0

% de personas que no recurre a la atención de la salud debido al estigma y la discriminación	TS
	id
	HSH
	id
	PID
	id
	Transgénero
	id

Mujeres 15-24	0.0
Hombres 15-24	0.1
Adultos, 15+	0.5

Acrónimos: n.a. ... no aplicable;  
PLHIV...personas que viven con el VIH; LHIV...vivir con el VIH; YW...mujeres jóvenes; YM...hombres jóvenes;  
SSR ... salud sexual y reproductiva.

Muy bueno  
Bueno  
Medio

Bajo  
Muy bajo  
id Datos insuficientes