

Sélectionnez le pays dans le menu déroulant

Cote d'Ivoire

CIV

Basé sur les données disponibles les plus récentes.

Version 2.02.

2023

Production (couverture)

Résultat (utilisation/comportement du service)

Impact

Préservatifs

Nombre de préservatifs distribués et vendus / an (en millions)	id	Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (%)	Femmes 15-49	38
Nombre de préservatifs distribués/vendus par couple-année (tranche d'âge 15-64)	id		Hommes 15-49	63
Besoin estimé de distribution de préservatifs satisfait (%)	id			

Hommes et garçons (y compris VMMC)

Nombre de CMMV réalisées / an (en milliers)	na	% de l'objectif 2020 de CMMV atteint	Hommes	na
% de l'objectif annuel de CMMV atteint	na	Prévalence nationale de la circoncision masculine (%)	Hommes 15-24	96
			Hommes 15-49	97

Prévention basée sur le traitement antirétroviral

Score composite PrEP (0-10)	5	% des besoins nationaux en PrEP satisfaits	Toutes pop.	40
Nombre de personnes ayant reçu la PrEP au moins une fois au cours des 12 derniers mois	676	% de PVVIH avec une charge virale supprimée	Femmes 15+	69
% de personnes vivant avec le HIV sous TAR	72		Hommes 15+	54

Populations clés

Professionnel(le)s du sexe (PS)

Estimation de la taille de la population des professionnel(le)s du sexe	66600	Utilisation du préservatif /dernier rapport sexuel rémunéré (%)	PS	92
% de PS ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	23		Hommes 15-49	63
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (PS)	> Moitié	% sous TAR	PS VVIH	id

Hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)

Estimation de la taille de la population des HSH	56000	Utilisation du préservatif /dernier sexe anal (%)	HSH	75
% de HSH ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	39		% sous TAR	HSH VVIH
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (HSH)	> Moitié			

Consommateurs de drogues injectables (CDI)

Estimation de la taille de la population des consommateurs de drogues injectables	2600	% avec des pratiques d'injection sûres	CDI	id
% des CDI qui ont reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	85	% suivant traitement de substitution aux opiacés		id
Stratégie de prévention comprenant les éléments essentiels de réduction des risques (CDI)	> Moitié	% sous TAR	CDI VIHV	id

Obstacles et facilitateurs structurels


Criminalisation du travail du sexe	Oui	% de personne qui évitent les soins en raison de la stigmatisation et de la discrimination	PS	14
Criminalisation des relations homosexuelles	Non		HSH	6
Criminalisation de l'usage de drogues ou de la possession de drogue pour usage personnel	Oui		CDI	9
Criminalisation des personnes transgenres	Non		P. transgenres	23

Adolescentes, jeunes femmes (AJF) et partenaires dans les milieux à forte incidence du VIH

% de lieux/districts prioritaires comportant des programmes dédiés pour les AJF	id	Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (%)	Femmes 15-24	42
Politiques éducatives en matière de VIH et éducation sexuelle (enseignement secondaire)	Oui		Hommes 15-24	67
Lois exigeant le consentement parental pour que les adolescents accèdent dépistage du VIH	Oui, <16	% terminé cycle inférieur d'éducation secondaire	Filles	22
Promotion du préservatif à l'initiative des fournisseurs intégrée aux services de SSR	Oui	% de femmes victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur mari/partenaire	Femmes 15-19	id
Services de dépistage du VIH intégrés aux services de SSR	id		Femmes 15 à 49	id

Nouvelles infections à VIH

(tendance chez les 15 ans et plus par rapport aux objectifs 2020 et 2025)



Niveau de référence 2010

● 2020, 2022

◆ Objectif 2020

◆ Objectif 2025

Les objectifs 2020 et 2025 représentent la contribution requise du pays aux objectifs mondiaux, à savoir une réduction de 75 % d'ici à 2020 et de 82,5 % d'ici à 2025 par rapport à 2010 comme niveau de référence.

Prévalence du VIH

PS <25 ans	1.7
PS de tous âges	4.8
HSH <25 ans	5.5
HSH tous âges	7.7
CDI <25 ans	id
CDI de tous âges	3.4

Résumé des résultats

AJF	na
PS	5
HSH	6
CDI	9
Préservatifs	id
CMMV	na
TAR	7
PrEP	5

Abréviations: na ... sans objet ;

PVVIH...personnes vivant avec le VIH; LHIV...vivant avec le VIH; JF...jeunes femmes; JH...jeunes hommes;

SSR ... Santé sexuelle et reproductive

Très bon

Bon

Moyen

Faible

Très faible

id Données insuffisantes