

Sélectionnez le pays dans le menu déroulant

Cote d'Ivoire

CIV

Basé sur les données disponibles les plus récentes.

Version 2.02.

2024

Production (couverture)

Résultat (utilisation/comportement du service)

Impact

Préservatifs		Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (%)		Nouvelles infections à VIH	
Nombre de préservatifs distribués et vendus / an (en millions)	66	Femmes 15-49	24		
Nombre de préservatifs distribués/vendus par couple-année (tranche d'âge 15-64)	8	Hommes 15-49	48		
Besoin estimé de distribution de préservatifs satisfait (%)	39				
Hommes et garçons (y compris VMMC)		% de l'objectif 2020 de CMMV atteint		Prévalence du VIH	
Nombre de CMMV réalisées / an (en milliers)	na	Hommes	na		
% de l'objectif annuel de CMMV atteint	na	Hommes 15-24	96		
		Hommes 15-49	97		
Prévention basée sur le traitement antirétroviral		% des besoins nationaux en PrEP satisfaits		Prévalence du VIH	
Score composite PrEP (0-10)	4	Toutes pop.	0		
Nombre de personnes ayant reçu la PrEP au moins une fois au cours des 12 derniers mois	676	Femmes 15+	69		
% de personnes vivant avec le HIV sous TAR	73	Hommes 15+	55		
Populations clés		Utilisation du préservatif /dernier rapport sexuel rémunéré (%)		Prévalence du VIH	
<i>Professionnel(le)s du sexe (PS)</i>					
Estimation de la taille de la population des professionnel(le)s du sexe	id	PS	92	PS <25 ans	1.7
% de PS ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	23	Hommes 15-49	id	PS de tous âges	4.8
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (PS)	> Moitié	% sous TAR	id		
<i>Hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)</i>					
Estimation de la taille de la population des HSH	id	HSH	75	HSH <25 ans	5.5
% de HSH ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	39	HSH VVIH	id	HSH tous âges	7.7
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (HSH)	> Moitié				
<i>Consommateurs de drogues injectables (CDI)</i>					
Estimation de la taille de la population des consommateurs de drogues injectables	id	CDI	id	CDI <25 ans	id
% des CDI qui ont reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	85	% suivant traitement de substitution aux opiacés	id	CDI de tous âges	3.4
Stratégie de prévention comprenant les éléments essentiels de réduction des risques (CDI)	< Moitié	% sous TAR	id		
<i>Obstacles et facilitateurs structurels</i>					
Criminalisation du travail du sexe	Oui	PS	14		
Criminalisation des relations homosexuelles	Non	% de personne qui évitent les soins en raison de la stigmatisation et de la discrimination	HSH		
Criminalisation de l'usage de drogues ou de la possession de drogue pour usage personnel	Oui		CDI		
Criminalisation des personnes transgenres	Non		P. transgenres		
<i>Adolescentes, jeunes femmes (AJF) et partenaires dans les milieux à forte incidence du VIH</i>					
% de lieux/districts prioritaires comportant des programmes dédiés pour les AJF	id	Femmes 15-24	27	Femmes 15-24	0.8
Politiques éducatives en matière de VIH et éducation sexuelle (enseignement secondaire)	Oui	Hommes 15-24	50	Hommes 15-24	0.4
Lois exigeant le consentement parental pour que les adolescents accèdent au dépistage du VIH	Oui, <16	% terminé cycle inférieur d'éducation secondaire	Filles	Adultes, 15+	2.2
Promotion du préservatif à l'initiative des fournisseurs intégrée aux services de SSR	Oui	% de femmes victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur mari/partenaire	Femmes 15-19		
Services de dépistage du VIH intégrés aux services de SSR	id		Femmes 15 à 49		

Niveau de référence 2010

● 2020, 2022

◆ Objectif 2020

◆ Objectif 2025

Les objectifs 2020 et 2025 représentent la contribution requise du pays aux objectifs mondiaux, à savoir une réduction de 75 % d'ici à 2020 et de 82,5 % d'ici à 2025 par rapport à 2010 comme niveau de référence.

Résumé des résultats

AJF
na
PS
5
HSH
6
CDI
9
Préservatifs
4
CMMV
na
TAR
7
PrEP
4

Abréviations: na ... sans objet ;

PVVIH...personnes vivant avec le VIH; LHIV...vivant avec le VIH; JF...jeunes femmes; JH...jeunes hommes;

SSR ... Santé sexuelle et reproductive

Très bon

Bon

Moyen

Faible

Très faible

id Données insuffisantes