

Resultado (cobertura)

Resultado (uso/comportamento do serviço)

Impacto

Preservativos		Uso de preservativo com parceiros não regulares (%)		Novas infecções por VIH	
Número de preservativos distribuídos e vendidos/ano (em milhões)	109	Mulheres 15-49	37		
Número de preservativos distribuídos/vendidos por casal-ano (faixa etária 15-64)	12	Homens 15-49	47		
Estimativa de distribuição de preservativos necessária alcançada (%)	48				
Homens e meninos (incluindo VMMC)		% alcançada da meta de VMMC para 2020		Prevalência de VIH	
Número de VMMCs realizados/ano (em milhares)	163	Homens	27	<p>Linha de base 2010</p> <p>● 2020, 2022</p> <p>◆ Meta 2020</p> <p>◆ Meta 2025</p> <p>As metas para 2020 e 2025 representam a contribuição necessária do país para as metas globais, uma redução de 75% até 2020 e uma redução de 82,5% até 2025 em relação a 2010 como linha de base.</p>	
% da meta anual de CMMV alcançada	77	Homens 15-24	id		
		Homens 15-49	75		
Prevenção baseada em ARV		% da necessidade nacional de PrEP atendida		Prevalência de VIH	
Pontuação composta de PrEP (0-10)	3	Todos pop.	0		
Número de pessoas que receberam PrEP pelo menos uma vez nos últimos 12 meses	0	Mulheres 15+	82		
		Homens 15+	72		
% de PVVIH em TARV	86				
Populações-chave					
Trabalhadoras/es sexuais (TS)		Uso de preservativo/última relação sexual paga (%)		PS <25 anos	
Estimativa do tamanho da população para profissionais do sexo	id	PS	id	id	
% de TS que receberam pelo menos duas intervenções de prevenção do VIH (últimos 3 meses)	57	Homens 15-49	id	PS todas as idades	
Estratégia de prevenção, incluindo principais elementos do pacote de prevenção de TS	> Metade	% em ART	id		
Homens gays e outros homens que praticam sexo com homens (HSH)		Uso de preservativo/último sexo anal (%)		HSH <25 anos	
Estimativa do tamanho da população para homens que fazem sexo com homens	id	HSH	id	id	
% de HSH que receberam pelo menos duas intervenções de prevenção do VIH (últ. 3 meses)	31	% em ART	id	HSH todas as idades	
Estratégia de prevenção, incluindo principais elementos do pacote de prevenção de HSH	> Metade				
Pessoas que injetam drogas (PID)		% com práticas seguras de injeção		PID <25 anos	
Estimativa do tamanho da população para pessoas que injetam drogas	id	PID	id	id	
% de PID que recebeu pelo menos duas intervenções de prevenção do VIH (últimos 3 meses)	40	% no tratamento de substituição de opioides	id	PID todas as idades	
Estratégia de prev., incluindo os elementos centrais do pacote de redução de riscos (PID)	< Metade	% em ART	id		
Barreiras estruturais e facilitadores		% de pessoas que evitaram tratamento de saúde devido a estigma e a discriminação			
Criminalização do trabalho sexual	Não	PS	id		
Criminalização de atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo	Não	HSH	id		
Criminalização do uso/consumo ou posse de drogas para uso pessoal	Sim	PID	id		
Criminalização de transgêneros	Não	Transgênero	id		
adolescentes, mulheres jovens (MAMJ) e parceiros em ambientes de alta incid. de VIH		Uso de preservativo com parceiros não regulares (%)		Mulheres 15-24	
% de locais/distritos prioritários com programas dedicados para MAMJ e parceiros	35	Mulheres 15-24	41	6.2	
Políticas educacionais sobre VIH e educação sexual (ensino secundário)	Sim	Rapazes 15-24	51	2.4	
Leis que exigem consentimento parental para o acesso a serviços de testes de VIH	Sim, <12	% que concl. o terceiro ciclo do ensino básico	11	Adultos, 15+ 11.8	
Promoção do preservativo iniciada pelo fornecedor integrada nos serviços de SSR	Sim	% de mulheres sofreram violência física ou sexual do marido/companheiro	id		
Serviços de testagem de VIH integrados aos serviços de SSR	Sim		id		

Resumo das pontuações

MAMJ	3
PS	id
HSH	id
PID	4
Preservativos	4
CMMV	5
ART	9
PrEP	3

Siglas: na ... não aplicável;  
 PVVIH...pessoas vivendo com VIH; VIH...vivendo com VIH; YW...mulheres jovens; YM...homens jovens;  
 SSR ... saúde sexual e reprodutiva.

Muito bom  
 Bom  
 Médio  
 Baixo  
 Muito baixo  
 Dados insuficientes