



Nouvelles infections à VIH chez les adultes de 15 ans et plus




Il y a eu une diminution de **37%** des nouvelles infections à VIH et de 62 % des décès liés au sida entre 2010 et 2018. Néanmoins, davantage de travail est nécessaire pour réduire les nouvelles infections de 75 % d'ici 2020.

OBJECTIF MONDIAL **-75%**

Nouvelles infections à VIH



Prévalence du VIH parmi les jeunes (%)



ADOLESCENTES, JEUNES FEMMES ET PARTENAIRES MASCULINS

Utilisation du préservatif avec un partenaire non régulier chez les jeunes (%)

Jeunes femmes: 24% | Jeunes hommes: 31% | Objectif: 90%

3 d'endroits prioritaires qui ont des programmes pour adolescentes et jeunes femmes

PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel rémunéré (%)

Professionnel(le)s du sexe: 69% | Clients: 34% | Objectif: 95%

Ont reçu deux interventions au cours des 3 derniers mois (%)

HOMOSEXUELS ET AUTRES HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport anal (%)

77% | Objectif: 90%

Ont reçu deux interventions au cours des 3 derniers mois (%)

CONSOMMATEURS DE DROGUES INJECTABLES

Utilisation du préservatif lors du dernier rapport anal (%)

Avec des injections sûres: 22% | En TSO: 40% | Objectif: 95%

Ont reçu deux interventions au cours des 3 derniers mois (%)

PRÉSERVATIFS

Utilisation du préservatif avec un partenaire non régulier

Femmes 15-49: 23% | Hommes 15-49: 34% | Objectif: 90%

21% Besoin de distribution de préservatifs satisfait (%)

CIRCONCISION MASCULINE MÉDICALE VOLONTAIRE

Recours à la circoncision médicale masculine volontaire

% de l'objectif 2020 atteint: 2017, 2018, 2019, 2020 | Objectif: 90%

Prévalence de la circoncision masculine 15-24

Objectif annuel de circoncision médicale masculine volontaire atteint (%)

INTERVENTION BASÉE SUR LES ARV

PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION

TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL

356 Nombre de personnes ayant utilisé la PrEP orale au moins une fois au cours des 12 derniers mois

Score composite de préparation à la PrEP (0-10): 4


Country messages: Le programme multisectoriel a organisé une table ronde avec des ministères clés sur la riposte au VIH pour les adolescents et les jeunes. Tous se sont engagés à soutenir les efforts de lutte contre le VIH chez les jeunes. Il est nécessaire de concentrer les efforts sur les lieux où l'incidence du VIH est la plus élevée chez les jeunes femmes.

Le programme national de lutte contre le sida, avec le soutien du Fonds mondial et de l'ONUSIDA, mène des travaux préparatoires à l'auto-dépistage et à la PrEP dans certaines provinces pilotes avant un développement à plus grande échelle en mettant l'accent sur les populations clés.

Le nombre de personnes sous traitement antirétroviral a été multiplié par six, passant de 43 800 en 2010 à 257 000 en 2018.

Scores (0-10): 3 (Très bon), 4 (Bon), 21 (Moyen), 2 (Bas), 0 (Très bas)

Estimation du financement et des lacunes de la prévention du VIH




Facilitateurs et systèmes


SOINS DE SANTÉ ÉVITÉS EN RAISON DE LA STIGMATISATION ET DE LA DISCRIMINATION (%)




FEMMES MARIÉES DÉCIDANT DE LEURS PROPRES SOINS DE SANTÉ (%)




FEMMES SUBISSANT VIOLENCE DE PARTENAIRE INTIME (%)



STRATÉGIE DE SANTÉ ET DE DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS : NIVEAU DE LIENS AVEC LE VIH (SCORE 0-10)



État des 10 actions de la feuille de route



PROCHAINES ÉTAPES :

- > Accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs grâce à l'élaboration de la planification stratégique nationale pour 2020-2023, de la note conceptuelle du Fonds mondial et de la COP du PEPFAR pour 2020.
- > Comblent le déficit de programmation pour les populations clés en termes de prévention, de dépistage et de traitement.
- > Renforcer la programmation des préservatifs en mettant l'accent sur les jeunes et les autres populations et lieux où l'incidence du VIH est plus élevée.